

出典:河野和彦2006

H 年 月 日

H 年 月 日

H 年 月 日

投与薬剤 1 \_\_\_\_\_  
 2 \_\_\_\_\_  
 3 \_\_\_\_\_  
 4 \_\_\_\_\_  
 5 \_\_\_\_\_

1 \_\_\_\_\_  
 2 \_\_\_\_\_  
 3 \_\_\_\_\_  
 4 \_\_\_\_\_  
 5 \_\_\_\_\_

1 \_\_\_\_\_  
 2 \_\_\_\_\_  
 3 \_\_\_\_\_  
 4 \_\_\_\_\_  
 5 \_\_\_\_\_

A 陽性症状	なし	軽度	中度	重度
1. いらだち 怒り 大声 暴力	0	1	2	3
2. 介護抵抗 入浴拒否	0	1	2	3
3. 帰宅願望 外出企図	0	1	2	3
4. 不眠	0	1	2	3
5. 徘徊(1日中 日中 夜間)	0	1	2	3
6. 自己顕示 ナースコール頻回	0	1	2	3
7. 焦り	0	1	2	3
8. 妄想 幻覚 独語	0	1	2	3
9. 神経質	0	1	2	3
10. 盗み 盗食 大食 異食	0	1	2	3
11. その他( )	0	1	2	3

A	なし	軽度	中度	重度
1.	0	1	2	3
2.	0	1	2	3
3.	0	1	2	3
4.	0	1	2	3
5.	0	1	2	3
6.	0	1	2	3
7.	0	1	2	3
8.	0	1	2	3
9.	0	1	2	3
10.	0	1	2	3
11.	0	1	2	3

A	なし	軽度	中度	重度
1.	0	1	2	3
2.	0	1	2	3
3.	0	1	2	3
4.	0	1	2	3
5.	0	1	2	3
6.	0	1	2	3
7.	0	1	2	3
8.	0	1	2	3
9.	0	1	2	3
10.	0	1	2	3
11.	0	1	2	3

B 陰性症状	なし	軽度	中度	重度
1. 食欲低下	0	1	2	3
2. あまり動かない(活力低下)	0	1	2	3
3. 昼寝 傾眠 発語低下 無表情	0	1	2	3
4. うつ状態(否定的発言 自殺)	0	1	2	3
5. 無関心(リハビリ等不参加)	0	1	2	3
6. その他( )	0	1	2	3

B	なし	軽度	中度	重度
1.	0	1	2	3
2.	0	1	2	3
3.	0	1	2	3
4.	0	1	2	3
5.	0	1	2	3
6.	0	1	2	3

B	なし	軽度	中度	重度
1.	0	1	2	3
2.	0	1	2	3
3.	0	1	2	3
4.	0	1	2	3
5.	0	1	2	3
6.	0	1	2	3

C 体幹バランス	なし	軽度	中度	重度
1. 体幹傾斜	0	1	2	3
2. 易転倒性	0	1	2	3
3. 小刻み歩行	0	1	2	3
4. 嚥下不良 むせる	0	1	2	3
5. 突進 振戦(PD)	0	1	2	3
6. その他( )	0	1	2	3

C	なし	軽度	中度	重度
1.	0	1	2	3
2.	0	1	2	3
3.	0	1	2	3
4.	0	1	2	3
5.	0	1	2	3
6.	0	1	2	3

C	なし	軽度	中度	重度
1.	0	1	2	3
2.	0	1	2	3
3.	0	1	2	3
4.	0	1	2	3
5.	0	1	2	3
6.	0	1	2	3

A 合計点

B 合計点

C 合計点

過鎮静 良好 要鎮静

過鎮静 良好 要鎮静

過鎮静 良好 要鎮静